

Een foto van de pols; en dan?

U bent verwezen naar de afdeling Radiologie. Er wordt een foto gemaakt omdat u misschien iets gebroken hebt.

Als er iets gebroken is

Als er iets gebroken is, gaat u voor behandeling naar de spoedeisende hulp. U kunt zich daar melden bij de balie. U krijgt dan verdere uitleg.

Als er niets gebroken is

Is er niets gebroken? Dan is de pols gekneusd. Er is geen verdere behandeling nodig. U mag dan naar huis. De volgende dag kijkt de dokter nog een keer naar de foto. Als het nodig is, dan belt de dokter u.

Wij vertellen uw eigen huisarts dat u de huisartsenpost bezocht hebt. Hij/zij ontvangt ook de uitslag van de foto.

Wat u zelf kunt doen:

- Koel de pols. Gebruik hiervoor een ice pack of iets anders uit de vriezer. Dit wikkelt u in een washandje of theedoek. Leg dit 10 minuten op de pols. Doe dit een paar keer per dag, twee dagen lang.
- Geef de pols rust. Leg de pols hoog op een kussen of gebruik een mitella (actimotive mitella Sling). Hierbij is het belangrijk dat de pols hoger hangt dan de elleboog. U koopt een mitella bij de apotheek of drogist.
- Als u wilt, kunt u zelf een drukverband om de pols doen. Het verband kunt u 3 tot 5 dagen laten zitten. Dit is te koop bij de apotheek of drogist.
- Beweeg de pols voorzichtig. Dit doet u elk uur een paar keer. U voelt zelf aan de pijn hoe ver u de pols kunt bewegen. Als het teveel pijn doet, stopt u de beweging.

Medicijn tegen de pijn (volwassenen):

- U mag paracetamol innemen: 3 tot 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg.
- Als u met paracetamol nog steeds veel pijn heeft, mag u naast de paracetamol ook ibuprofen innemen: 3 keer per dag 400mg. Let op: slik alleen ibuprofen als u weet dat u dit mag innemen. Bij twijfel overlegt u met uw arts of apotheker.

Medicijn tegen de pijn (kinderen):

- U mag uw kind paracetamol geven: op de verpakking staat hoeveel.
- Als paracetamol niet helpt mag u ook Nurofen drank geven: op de verpakking staat hoeveel.
- Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook ibuprofen: op de verpakking staat hoeveel.

Neem contact op met uw eigen huisarts als:

- de adviezen niet helpen
- de klachten langer dan 5 tot 7 dagen duren
- u zich zorgen maakt
- u vragen heeft

